

Terapia naczyniowa

Rozszerzone naczynka to problem wielu kobiet oraz mężczyzn niezależnie od wieku. Na ich powstawanie mają wpływ czynniki zewnętrzne oraz wrodzone tendencje. W przypadku kobiet problem ten najczęściej wywołują estrogeny wpływające na pracę mięśni naczyń włosowatych. Trwałe zmiany na skórze mogą prowadzić do pojawienia się trądziku różowatego, dlatego ważne jest szybkie rozpoczęcie kuracji.

Zasada działania zabiegu _____

W leczeniu zmian naczyniowych przy użyciu światłem IPL chromatoforem docelowym jest oksyhemoglobina. Energia świetlna jest przez nią pochłaniana i zamieniana w ciepło. Do krzepnięcia krwi wewnątrz naczynia dochodzi w temperaturze powyżej 70C. ciepło przenoszone zostaje na ściany naczynia wywołując jego koagulację co w rezultacie prowadzi do jego zamknięcia.

Częstotliwość _____

Odstęp pomiędzy poszczególnymi zabiegami powinien wynosić 2-3 tygodnie

Efekty uboczne

Może pojawić się rumień lub inne podrażnienie. Należy stosować wtedy chłodne kompresy. U osób jasnej karnacji zaczerwienienia skóry znikną w przeciągu kilku godzin, u klientów o ciemniejszym odcieniu skóry może to zająć nieco więcej czasu.